

FR9101406 - Petite Camargue

Base de données mise à jour le : 08/02/2023

Fiche éditée le : 16/04/2025

Identification du site

Code	FR9101406	Nom	Petite Camargue	Surface totale du site (ha)	34 412 ha
Directive	Habitat	Type	ZSC	Pourcentage de superficie marine (%)	/

Situation

Localisation				Région(s) biogéographique(s)
Région(s)	Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Département(s)	Bouches-du-Rhône (13), Gard (30)	Méditerranéenne (100%)

Gestion et propriété

Gestionnaire(s)	Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise pour la partie gardoise du site.	Régimes de propriété	Autre (0%), Domaine public maritime (0%), Domaine privé de l'état (0%), Domaine départemental (0%), Domaine public de l'état (Non précisé), Propriété privée (personne physique) (Non précisé), Collectivité territoriale (Non précisé)
------------------------	--	-----------------------------	---

Description

Caractère général du site

<i>Classes d'habitats</i>	<i>Couverture</i>
Marais salants, Prés salés, Steppes salées	25 %
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	20 %
Autres terres arables	15 %
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	10 %
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %
Rizières	7 %
Dunes, Plages de sables, Machair	5 %
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
Forêts de résineux	2 %
Forêts caducifoliées	1 %

Autres caractéristiques du site

Présence de vignes (2% du site).

Qualité et importance

Ce site, indissociable de la Camargue provençale, est une grande zone humide littorale sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux influences de la mer (lagunes et dunes côtières actives) et des eaux douces (cours d'eau, marais, étangs). Il comprend deux ensembles très intéressants :

- d'une part une zone laguno-marine où s'étend un vaste système dunaire très actif (zone d'engraissement du littoral) et très complet (nombreuses variantes d'habitats dunaires). On trouve un important massif dunaire actif avec de nombreuses dunes vives et fixées dont certaines boisées (Genévriers et Pins pignons). D'anciens massifs dunaires situés à l'intérieur des terres sont recouverts par des forêts de Pin pignon. C'est le seul site en Languedoc-Roussillon où cet habitat est représentatif et bien conservé.
- d'autre part une zone fluvio-lacustre constituée de marais et d'étangs doux à saumâtres. Cet ensemble constitue un système dépressionnaire recevant par gravité les eaux du Rhône, du plateau des Costières, du Vistre et du Vidourle. Il comprend de grands étangs peu ou pas salés (Scamandre, Charnier) entourés par une importante roselière de plus de 2500 ha. Elle est un site majeur pour l'avifaune. Une zone importante de prairie humides, riche en espèces remarquables, est présente au nord. Des ripisylves complètent cet ensemble d'habitats.

On trouve également dans les zones soumises à l'action du coin salé, des secteurs de steppes salées à Limonium et diverses sansouires. Les habitats naturels (prés salés, sansouires) se présentent sous de nombreux faciès en fonction des facteurs du milieu (topographie, permanence de l'eau, et degré de salinité). Ce site englobe également l'ensemble du site de production des salins d'Aigues-Mortes, à cheval sur les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône.

En ce qui concerne les chiroptères, l'ensemble des espèces trouve ici essentiellement un territoire de chasse et de reproduction. Les présences du Grand Capricorne, de la Lucane cerf-volant, de l'Agrion de mercure et de la Cordulie à corps fin ont pu être notées même si peu de données sont disponibles.

Vulnérabilité

En fonction des enjeux naturels on peut relever plusieurs types de vulnérabilité :

- Cistude d'Europe : pollutions des sites importants pour l'espèce, destruction des sites de ponte, expansion de tortues introduites
- pinèdes de pins pignons : défrichement et pâturage inadapté,
- milieux boisés linéaires (ripisylves et fourrés de Tamaris) : destruction par aménagements hydrauliques et recalibrages, endiguements ou enrochements,
- habitats de prés-salés et sansouires : modifications des régimes hydriques (apports d'eau douce dans des milieux salés, conversion en marais de chasse), parcellisation et artificialisation des habitats naturels, surpâturage
- prairies humides méditerranéennes à grandes herbes et mégaphorbiaies : mise en culture, drainage, surpâturage, modification du régime hydrique
- lagunes côtières : réarrangement des berges, modifications hydrique (apports d'eau salée ou douce)
- végétation des lâisses de mer : nettoyage des plages, piétinement, fixation du trait de côte
- La fragilité du trait de côte constitue également une cause de vulnérabilité pour l'ensemble des habitats côtiers, en particulier les milieux dunaires, avec une baisse globale des apports sédimentaires et un piétinement, et les steppes salées, qui restent très fortement soumis au risque de destruction par les tempêtes marines.

Mesures de conservation

/

Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9101406 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9101406 (par la zone protégée)
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	92 %	Interntaionale	Camargue	Partiel	11 %
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	92 %	Interntaionale	Petite Camargue	Englobant	92 %
Site inscrit selon la loi de 1930	43 %	Nationale et régionale	site inscrit de la Camargue Gardoise	Partiel	41 %
Site classé selon la loi de 1930	15 %	Nationale et régionale	Divers sites classés	Englobant	100 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	3 %	Nationale et régionale	TERRE NEUVE	Englobant	100 %
Réserve naturelle régionale	1 %	Nationale et régionale	Scamandre	Englobant	100 %
Parc naturel régional	11 %	Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	

Terrain acquis par un département	2 %	Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	1 %	Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	
Réserve de chasse et de faune sauvage	1 %	Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	
Commentaires					
/					

Habitats											
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Habitat prioritaire	Habitat inféodé aux milieux aquatiques	Surface de l'habitat	Représentativité	Superficie relative	Degré de conservation	Evaluation globale	Caves	Qualité des données
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	11 - Eaux marines et milieux à marées	1150 - Lagunes côtières	O	O	7 851,20 ha	Significative	100% ≥ p > 15%	Moyenne	Significative	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	12 - Falaises maritimes et plages de galets	1210 - Végétation annuelle des laissés de mer		O	5,91 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	13 - Marais et prés salés atlantiques et continentaux	1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses		O	197,02 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Excellente	Excellente	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	14 - Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atla	1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)		O	1 599,80 ha	Bonne	15% ≥ p > 2%	Bonne	Excellente	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	14 - Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atla	1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)		O	1 111,40 ha	Bonne	15% ≥ p > 2%	Bonne	Excellente	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	15 - Steppes intérieures halophiles et gypsophiles	1510 - Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)	O	O	64,96 ha	Excellente	2% ≥ p > 0	Excellente	Excellente	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	21 - Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer	2110 - Dunes mobiles embryonnaires		O	35,27 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	21 - Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer	2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)		O	88,62 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	21 - Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer	2190 - Dépressions humides intradunaires		O	9,98 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Excellente	Excellente	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae		O	77,62 ha	Excellente	2% ≥ p > 0	Excellente	Excellente	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2250 - Dunes littorales à Juniperus spp.	O	O	161,44 ha	Excellente	2% ≥ p > 0	Excellente	Excellente	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia		O	4,36 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Excellente	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster	O	O	570,74 ha	Excellente	2% ≥ p > 0	Excellente	Excellente	/	Bonne
3 - Habitats d'eaux douces	31 - Eaux dormantes	3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition		O	1 449,08 ha	Significative	15% ≥ p > 2%	Moyenne	Significative	/	Bonne
3 - Habitats d'eaux douces	31 - Eaux dormantes	3170 - Mares temporaires méditerranéennes	O	O	27,36 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne	/	Bonne
6 - Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	64 - Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes	6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion		O	108,70 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
6 - Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	64 - Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		O	7,06 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Excellente	Significative	/	Bonne
6 - Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	65 - Pelouses mésophiles	6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)			80,27 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Excellente	Significative	/	Bonne
9 - Forêts	92 - Forêts méditerranéennes à feuilles caduques	92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba		O	291,96 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
9 - Forêts	92 - Forêts méditerranéennes à feuilles caduques	92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)			255,94 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne	/	Bonne

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE															
	Légende														
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional								
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable								
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable						
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Invertébrés (Insectes - Coléoptères)	1083	Lucanus cervus	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant		/	NT	/	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Invertébrés (Insectes - Coléoptères)	1088	Cerambyx cerdo	Grand Capricorne (Le)		/	NT	VU	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Invertébrés (Insectes - Odonates)	1041	Oxygastra curtisii	Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')	O	LC	NT	LC	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Invertébrés (Insectes - Odonates)	1044	Coenagrion mercuriale	Agriion de Mercure	O	LC	NT	NT	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Invertébrés (Insectes - Odonates)	1046	Gomphus grasilinii	Gomphe de Grasilin (Le), Gomphe à cercoïdes fourchus (Le)	O	LC	NT	NT	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Mammifères (Chiroptères)	1304	Rhinolophus ferrumequinum	Grand rhinolophe		LC	NT	LC	Reproduction	51 - 100 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Mammifères (Chiroptères)	1307	Myotis blythii	Petit Murin		NT	NT	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Mammifères (Chiroptères)	1310	Miniopterus schreibersii	Minioptère de Schreibers		VU	/	VU	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Mammifères (Chiroptères)	1321	Myotis emarginatus	Murin à oreilles échancrées, Vespertillon à oreilles échancrées		LC	LC	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Mammifères (Chiroptères)	1324	Myotis myotis	Grand Murin		LC	LC	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Reptiles	1220	Emys orbicularis	Cistude d'Europe (La)	O	LC	NT	/	Sédentaire	1 001 -10 000 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Excellente	Bonne
Reptiles	1221	Mauremys leprosa	Émyde lépreuse (L')	O	VU	VU	/	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Autres activités agricoles	Impacts et activités sur le site	Positive	Elevée	/	/	/
Autres formes d'habitations	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Centres d'interprétation	Impacts et activités aux alentours du site	Non évaluée	Moyenne	/	/	/
Chasse	Impacts et activités sur le site	Non évaluée	Faible	/	/	/
Envasement	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Erosion	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)	Impacts et activités aux alentours du site	Négative	Moyenne	/	/	/
Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes...)	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Modifications du fonctionnement hydrographique	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Pâturage	Impacts et activités sur le site	Positive	Elevée	/	/	/
Piétinement, surfréquentation	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)	Impacts et activités sur le site et aux alentours	Négative	Elevée	/	/	/
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)	Impacts et activités aux alentours du site	Négative	Elevée	/	/	/
Routes, sentiers et voies ferrées	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives	Impacts et activités aux alentours du site	Négative	Moyenne	/	/	/
Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives	Impacts et activités sur le site	Non évaluée	Moyenne	/	/	/
Zones urbanisées, habitations	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Zones urbanisées, habitations	Impacts et activités aux alentours du site	Négative	Faible	/	/	/

Identification du site					
Code	FR9101408	Nom	Étang de Mauguio	Surface totale du site (ha)	7 020 ha
Directive	Habitat	Type	ZSC	Pourcentage de superficie marine (%)	0 %

Situation				
Localisation				Région(s) biogéographique(s)
Région(s)	Occitanie	Département(s)	Gard (30), Hérault (34)	Méditerranéenne (100%)
Gestion et propriété				
Gestionnaire(s)	Syndicat Mixte du Bassin de l'Or		Régimes de propriété	Domaine public de l'état (59%), Propriété privée (personne physique) (28%), Collectivité territoriale (13%)

Description		
Caractère général du site		
	Classes d'habitats	Couverture
	Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	46 %
	Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	20 %
	Marais salants, Prés salés, Steppes salées	20 %
	Autres terres arables	5 %
	Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	5 %
	Dunes, Plages de sables, Machair	2 %
	Forêts caducifoliées	2 %

Autres caractéristiques du site

/

Qualité et importance

L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est une lagune en communication avec la mer par un grau qui relie le Sud Ouest de l'étang au port de Carnon. Il est entouré par une gamme variée d'habitats naturels :

- un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon état de conservation mais séparées du système lagunaire par une route littorale.
- des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives Sud et Est et des lagunes temporaires, riches en herbiers de Ruppia et des sansouires sur le bordure des rives Nord.
- des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur les rives Nord, où se développent des prés salés et des formations boisées (frênes, peupliers blancs) et d'anciens prés de fauche.

Les rives Nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral languedocien et sont marquées par une occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures).

Vulnérabilité

La lagune est menacée naturellement comme l'ensemble des lagunes du littoral languedocien par des phénomènes d'eutrophisation et de comblement et elle est soumise à une forte pression anthropique.

La vulnérabilité de la lagune et des zones humides périphériques associées est lié au bassin versant de l'étang de l'or qui regroupe 39 communes et 185 000 habitants permanents. La situation du plan d'eau se trouve donc fortement liée aux activités implantées (urbanisation, agriculture) sur ce bassin versant vaste et urbanisé. La qualité de l'assainissement des eaux usées domestiques recherchée sur ces espaces est donc déterminante pour l'avenir de l'étang.

La vulnérabilité des milieux dunaires (le Petit et Grand Travers) est liée à la fréquentation touristique très importante sur cette portion de côte en période estivale.

Le site présente un patrimoine naturel remarquable dont la conservation dépend fortement de l'amélioration de la qualité de l'eau de la lagune et des écosystèmes aquatiques, et du maintien de la diversité des habitats naturels des marges de l'étang.

Mesures de conservation

/

Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9101408 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9101408 (par la zone protégée)
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	84 %	Interntaionale	Petite Camargue	Partiel	84 %
Site classé selon la loi de 1930	70 %	Nationale et régionale	site classé de l'étang de l'Or	Inclus	70 %
Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique	14 %	Nationale et régionale	Marais de la Castillone	Inclus	1 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	11 %	Nationale et régionale	ETANG DE L'OR	Partiel	1 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	11 %	Nationale et régionale	LE PETIT COGUL	Inclus	1 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	11 %	Nationale et régionale	LE GRAND TRAVERS	Inclus	4 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	11 %	Nationale et régionale	LE PETIT TRAVERS	Inclus	2 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	11 %	Nationale et régionale	TARTUGUIERES	Inclus	3 %

Commentaires

/

Habitats											
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Habitat prioritaire	Habitat inféodé aux milieux aquatiques	Surface de l'habitat	Représentativité	Superficie relative	Degré de conservation	Evaluation globale	Caves	Qualité des données
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	11 - Eaux marines et milieux à marées	1150 - Lagunes côtières	O	O	3 487,00 ha	Bonne	15% ≥ p > 2%	Moyenne	Significative	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	13 - Marais et prés salés atlantiques et continentaux	1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses		O	149,00 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	14 - Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atla	1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)		O	144,00 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	14 - Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atla	1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)		O	401,00 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	21 - Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer	2110 - Dunes mobiles embryonnaires		O	13,00 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Bonne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	21 - Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer	2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)		O	1,00 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	21 - Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer	2190 - Dépressions humides intradunaires		O	0,10 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Bonne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae		O	55,00 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2250 - Dunes littorales à Juniperus spp.	O	O	0,02 ha	Non significative	/	/	/	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia		O	10,00 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
2 - Dunes maritimes et intérieures	22 - Dunes maritimes des rivages méditerranéens	2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster	O	O	33,00 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
3 - Habitats d'eaux douces	31 - Eaux dormantes	3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp.		O	1,00 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne
9 - Forêts	92 - Forêts méditerranéennes à feuilles caduques	92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba		O	144,00 ha	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne	/	Bonne
9 - Forêts	92 - Forêts méditerranéennes à feuilles caduques	92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)			284,00 ha	Significative	15% ≥ p > 2%	Moyenne	Significative	/	Bonne

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE															
	Légende														
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional								
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable								
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable						
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Mammifères	1355	Lutra lutra	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	O	LC	NT	NT	Sédentaire	0 - 1 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Reptiles	1220	Emys orbicularis	Cistude d'Europe (La)	O	LC	NT	/	Sédentaire	201 - 484 Individus	Présente	100%>p>15%	Bonne	Isolée	Bonne	Bonne

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Accumulation de matière organique	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Antagonisme avec des espèces introduites	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Aquaculture (eau douce et marine)	Impacts et activités sur le site	Non évaluée	Faible	/	/	/
Autres formes de transport et de communication	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Chasse	Impacts et activités sur le site	Non évaluée	Moyenne	/	/	/
Envasement	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Erosion	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Espèces exotiques envahissantes	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Eutrophisation (naturelle)	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Pâturage	Impacts et activités sur le site	Positive	Moyenne	/	/	/
Piétinement, surfréquentation	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Routes, autoroutes	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Urbanisation continue	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Véhicules motorisés	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/

FR9101413 - Posidonies de la côte palavasienne

Base de données mise à jour le : 08/02/2023
Fiche éditée le : 16/04/2025

Identification du site					
Code	FR9101413	Nom	Posidonies de la côte palavasienne	Surface totale du site (ha)	11 119 ha
Directive	Habitat	Type	ZSC	Pourcentage de superficie marine (%)	100 %
Situation					
Localisation				Région(s) biogéographique(s)	
Région(s)	Occitanie	Département(s)	Hérault (34)	Méditerranéenne (100%)	
Gestion et propriété					
Gestionnaire(s)	Agence française pour la biodiversité		Régimes de propriété	Domaine public maritime (100%)	
Description					
Caractère général du site					
		Classes d'habitats	Couverture		
		Mer, Bras de Mer	100 %		
Autres caractéristiques du site					
Il s'agit d'une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l'on observe des touffes discontinues de Posidonies, ainsi que des secteurs relativement riches en espèces marines dont l'inventaire est en cours. Cette côte pourrait être visitée par le Grand Dauphin (Tursiops truncatus), qui fréquente les eaux peu profondes du plateau continental et du talus ainsi que par la Tortue caouanne (Caretta caretta) dont c'est l'un des rares sites marins régionaux , les autres étant le site " Posidonies de la Côte des Albères " et le site " Posidonies du Cap d'Agde "					
Qualité et importance					
Vulnérabilité					
Le site est sous l'influence directe de grandes stations littorales comme La Grande Motte ou Palavas et, de façon plus indirecte, de l'agglomération de Montpellier.					
Mesures de conservation					
/					
Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9101413 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9101413 (par la zone protégée)
Aucune protection	100 %	Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	
Commentaires					
/					

Habitats											
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Habitat prioritaire	Habitat inféodé aux milieux aquatiques	Surface de l'habitat	Représentativité	Superficie relative	Degré de conservation	Evaluation globale	Caves	Qualité des données
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	11 - Eaux marines et milieux à marées	1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine		O	5 561,72 ha	Excellente	100% ≥ p > 15%	Bonne	Bonne	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	11 - Eaux marines et milieux à marées	1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)	O	O	3 463,60 ha	Bonne	100% ≥ p > 15%	Moyenne	Bonne	/	Bonne
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	11 - Eaux marines et milieux à marées	1170 - Récifs		O	991,30 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Médiocre
1 - Habitats côtiers et végétations halophytiques	12 - Falaises maritimes et plages de galets	1210 - Végétation annuelle des laissés de mer		O	108,30 ha	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative	/	Bonne

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE															
	Légende														
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional								
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable								
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable						
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Mammifères	1349	Tursiops truncatus	Grand dauphin commun, Grand Dauphin	0	LC	DD	LC	Concentration	/	Rare	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Moyenne	Estimation impossible de la population
Poissons	1095	Petromyzon marinus	Lamproie marine	0	EN	LC	LC	Sédentaire	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Poissons	1103	Alosa fallax	Alose feinte atlantique	0	NT	LC	LC	Reproduction	/	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne
Reptiles	1224	Caretta caretta	Tortue caouanne (La), Caouanne, Tortue carette	0	DD	/	VU	Concentration	/	Rare	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Moyenne	Estimation impossible de la population

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Autres (par exemple filets dérivants)	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Dépôts de matériaux inertes	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Envasement	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Erosion	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Macro-pollution marine (par exemple sacs plastiques, polystyrène)	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Pêche de loisirs	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Pêche professionnelle passive (arts dormants)	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Piétinement, surfréquentation	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Réduction de la connectivité de l'habitat par une action anthropique (fragmentation)	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/

Identification du site					
Code	FR9112004	Nom	Hautes Garrigues du Montpelliérais	Surface totale du site (ha)	47 365 ha
Directive	Oiseaux	Type	ZPS	Pourcentage de superficie marine (%)	/

Situation				
Localisation				Région(s) biogéographique(s)
Région(s)	Occitanie	Département(s)	Hérault (34)	Méditerranéenne (100%)
Gestion et propriété				
Gestionnaire(s)	Communauté de communes Grand Pic Saint Loup		Régimes de propriété	Indéterminé (100%)

Description		
Caractère général du site		
	Classes d'habitats	Couverture
	Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	25 %
	Forêts sempervirentes non résineuses	20 %
	Forêts de résineux	15 %
	Pelouses sèches, Steppes	15 %
	Forêts mixtes	10 %
	Forêts caducifoliées	5 %
	Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	5 %
	Autres terres arables	2 %
	Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	2 %
	Prairies améliorées	1 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-est du département de l'Hérault. Plusieurs ensembles morphologiques peuvent y être individualisés : massif de la Serrane, causse de la Selle, gorges de l'Hérault, massifs du Pic Saint Loup et de l'Hortus, collines de la Suque et Puech des Mourgues.

Plusieurs de ces entités marquent très fortement le paysage et font à ce titre l'objet de protections.

Le pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du terrain aux détriments des pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, notamment sur les côteaux avec des objectifs d'amélioration de la qualité compatibles avec la préservation des habitats et des ressources alimentaires des oiseaux.

Situé aux portes de l'agglomération de Montpellier, le site est très fréquenté car il permet la pratique de loisirs et de sports de nature variés.

Qualité et importance

La Zone de Protection Spéciale proposée abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 30% des effectifs régionaux. Un quatrième site de nidification présent dans ce territoire a été abandonné en 1995

Parmi les autres espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux qui se rencontrent dans ce territoire, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré, le Crave à bec rouge, le Grand Duc d'Europe, l'Engoulevent et le Rollier d'Europe ont des effectifs significatifs.

Vulnérabilité

Le développement des projets de centrales éoliennes constitue l'une des principales menaces identifiées sur le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la conservation des habitats des espèces concernées et une concertation étroite avec les représentants des différentes productions locales, en particulier les crus AOC, doit être engagée. Le développement des activités de plein air, et notamment de l'escalade doit également faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux pour éviter le développement des perturbations liées à ces activités.

Mesures de conservation

/

Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9112004 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9112004 (par la zone protégée)
Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique	2 %	Nationale et régionale	4 arrêtés (Argeliers, Brissac, Le Rouet, St Bauzille de M.)	Inclus	2 %
Site classé selon la loi de 1930	22 %	Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	

Commentaires

/

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE															
	Légende														
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional								
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable								
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable						
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A029	Ardea purpurea	Héron pourpré	O	LC	LC	LC	Concentration	2 - 2 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A030	Ciconia nigra	Cigogne noire	O	EN, NA, VU	LC	LC	Concentration	2 - 2 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A031	Ciconia ciconia	Cigogne blanche	O	LC, NA	LC	LC	Concentration	10 - 10 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A072	Pernis apivorus	Bondrée apivore		LC	LC	LC	Reproduction	8 - 15 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A073	Milvus migrans	Milan noir		LC, NA	LC	LC	Reproduction	12 - 20 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A074	Milvus milvus	Milan royal		NA, VU	NT	LC	Concentration	2 - 2 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A077	Neophron percnopterus	Vautour percnoptère		EN	EN	EN	Concentration	2 - 2 Individus	Très rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A078	Gyps fulvus	Vautour fauve		LC	LC	LC	Concentration	10 - 40 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A079	Aegypius monachus	Vautour moine		EN, NA	LC	NT	Sédentaire	0 - 1 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Bonne
Oiseaux	A080	Circæus gallicus	Circaète Jean-le-Blanc		LC, NA	LC	LC	Reproduction	20 - 30 Couples	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Bonne
Oiseaux	A081	Circus aeruginosus	Busard des roseaux		NA, NT	LC	LC	Concentration	10 - 10 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A082	Circus cyaneus	Busard Saint-Martin		LC, NA	NT	LC	Hivernage	0 - 20 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A084	Circus pygargus	Busard cendré		NA, NT	LC	LC	Reproduction	8 - 16 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A091	Aquila chrysaetos	Aigle royal		VU	LC	LC	Sédentaire	1 - 1 Couples	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Bonne
Oiseaux	A092	Hieraaetus pennatus	Aigle botté		NT	LC	LC	Concentration	2 - 2 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A093	Hieraaetus fasciatus	Aigle de Bonelli		EN	/	/	Sédentaire	3 - 3 Couples	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A094	Pandion haliaetus	Balbuzard pêcheur	O	LC, NA, VU	LC	LC	Concentration	2 - 2 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A098	Falco columbarius	Faucon émerillon		DD, NA	LC	LC	Hivernage	1 - 1 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A103	Falco peregrinus	Faucon pèlerin		LC, NA	LC	LC	Sédentaire	4 - 6 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A127	Grus grus	Grue cendrée	O	CR, NA, NT	LC	LC	Concentration	10 - 10 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A128	Tetrax tetrax	Outarde canepetière		EN, NA	VU	NT	Reproduction	0 - 1 Couples	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A133	Burhinus oedicnemus	Oedicnème criard		LC, NA	LC	LC	Reproduction	0 - 10 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A215	Bubo bubo	Grand-duc d'Europe	O	LC	LC	LC	Sédentaire	26 - 50 Couples	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Bonne
Oiseaux	A224	Caprimulgus europaeus	Engoulevent d'Europe	O	LC, NA	LC	LC	Reproduction	1 123 - 2 205 Couples	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A229	Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe		NA, VU	VU	LC	Sédentaire	4 - 7 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A231	Coracias garrulus	Rollier d'Europe		NA, NT	LC	LC	Reproduction	36 - 57 Couples	Présente	15%>p>2%	Excellente	Marginale	Excellente	Bonne
Oiseaux	A246	Lullula arborea	Alouette lulu	O	LC, NA	LC	LC	Sédentaire	658 - 977 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Excellente	Bonne
Oiseaux	A255	Anthus campestris	Pipit rousseline	O	LC, NA	LC	LC	Reproduction	117 - 445 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A302	Sylvia undata	Fauvette pitchou	O	EN	NT	NT	Sédentaire	876 - 1 777 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A338	Lanius collurio	Pie-grièche écorcheur	O	NA, NT	LC	LC	Reproduction	2 - 10 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Crave à bec rouge		LC	LC	LC	Reproduction	2 - 4 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A379	Emberiza hortulana	Bruant ortolan	O	EN	LC	LC	Reproduction	50 - 150 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Alpinisme, escalade, spéléologie	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Autres zones industrielles / commerciales	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Lignes électriques et téléphoniques	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes...)	Impacts et activités sur le site	Positive	Faible	/	/	/

Identification du site					
Code	FR9112013	Nom	Petite Camargue laguno-marine	Surface totale du site (ha)	15 554 ha
Directive	Oiseaux	Type	ZPS	Pourcentage de superficie marine (%)	0 %

Situation				
Localisation			Région(s) biogéographique(s)	
Région(s)	Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Département(s)	Bouches-du-Rhône (13), Gard (30)	Méditerranéenne (100%)

Gestion et propriété			
Gestionnaire(s)	Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise	Régimes de propriété	Propriété privée (personne physique) (Non précisé), Domaine public maritime (Non précisé), Domaine public de l'état (Non précisé)

Description		
Caractère général du site		
	Classes d'habitats	Couverture
	Marais salants, Prés salés, Steppes salées	60 %
	Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	15 %
	Forêts de résineux	7 %
	Dunes, Plages de sables, Machair	4 %
	Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	3 %
	Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	3 %
	Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	3 %
	Forêts sempervirentes non résineuses	3 %
	Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %

Autres caractéristiques du site

Le territoire concerné comprend l'ensemble de la propriété salicole qui s'étend de part et d'autre de la limite entre les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, caractérisé par un ensemble de bassins de taille et de profondeurs variables et dont la concentration en sel varie selon un itinéraire précisément établi.

Des espaces annexes sont également inclus dans le périmètre, en particulier les principaux étangs de la plaine de l'Espiguette, quelques pinèdes et zones viticoles, et les propriétés agricoles en bordure du Vidourle, ces dernières constituant un site d'hivernage important pour l'Outarde canepetière.

L'ensemble constitue un ensemble remarquable, complémentaire de la grande Camargue désignée par ailleurs, encore peu altéré malgré la pression touristique qui s'exerce depuis les grandes stations du littoral gardois et héraultais.

Qualité et importance

Le site proposé en Zone de Protection Spéciale (ZPS) accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue :

- un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ;
- un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, à l'Outarde canepetière et à de nombreux passereaux ;
- une étape de migration (automne, printemps) pour plus de 160 espèces.

En outre, certaines espèces ont des effectifs particulièrement importants, supérieurs à 1% de la population biogéographique régionale (critère R3C de la convention de Ramsar). La richesse du site (nombre élevé d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ou patrimonial) et l'importance de certaines populations d'oiseaux sont principalement dues à :

- la diversité et à l'étendue importante des milieux naturels présents sur le site ;
- l'originalité de certains habitats naturels : estran (et milieu marin immédiat), marais salants, sansouïres et steppes salées, roselières... ;
- la position géographique du site, en rive nord de la Méditerranée, sur les axes migratoires de nombreuses espèces (vallée du Rhône).

Vulnérabilité

La plus grande partie de la ZPS est constituée par l'exploitation salicole dite d'Aigues-Mortes. Tant que cette activité continuera sur le site, les conditions d'accueil pour l'avifaune demeureront satisfaisantes. La société propriétaire des salins a récemment recruté un expert écologue pour garantir cette bonne gestion.

La zone d'hivernage de l'Outarde canepetière en bordure du Vidourle est plus vulnérable compte tenu des pressions diverses qui s'exercent sur cette zone (projets d'aménagement touristique ou urbains). Toutefois l'inondabilité de la zone devrait limiter les convoitises des aménageurs sur cette partie du territoire.

Au final, ce sont surtout des risques naturels, en particulier une intrusion marine par fort coup de mer, et la compétition interspécifique (notamment du fait de l'accroissement des populations de goélands) qui constituent des menaces pour l'avifaune patrimoniale du secteur.

Mesures de conservation

/

Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9112013 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9112013 (par la zone protégée)
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	75 %	Interntaionale	Camargue	Partiel	75 %
Parc naturel régional	25 %	Nationale et régionale	domaines de capelude, Terre Neuve et La Janine	Partiel	3 %
Site inscrit selon la loi de 1930	20 %	Nationale et régionale	Site inscrit de la Camargue	Partiel	20 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	8 %	Nationale et régionale	PNR de Camargue	Partiel	25 %
Site classé selon la loi de 1930	7 %	Nationale et régionale	panorama découvert depuis la voie littorale	Partiel	1 %
Site classé selon la loi de 1930	7 %	Nationale et régionale	Pointe de l'Espiguette et Rhône de St Roman	Partiel	4 %
Site classé selon la loi de 1930	7 %	Nationale et régionale	Etang de la Ville et ses abords	Inclus	2 %

Commentaires

/

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE															
	Légende														
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional								
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable								
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable						
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A001	Gavia stellata	Plongeon catmarin	o	DD, NA	LC	LC	Hivernage	1 - 5 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A002	Gavia arctica	Plongeon arctique	o	DD, NA	LC	LC	Hivernage	1 - 5 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A003	Gavia immer	Plongeon imbrin	o	VU	VU	LC	Hivernage	1 - 2 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A010	Calonectris diomedea	Puffin de Scopoli	o	NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A017	Phalacrocorax carbo	Grand Cormoran	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	1 000 -4 000 Individus	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A021	Botaurus stellaris	Butor étoilé	o	NA, VU	LC	LC	Sédentaire	0 - 6 Mâles	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A022	Ixobrychus minutus	/	o	EN, NA	LC	LC	Reproduction	1 - 10 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A023	Nycticorax nycticorax	/	o	NA, NT	LC	LC	Reproduction	0 - 190 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A024	Ardeola ralloides	/	o	LC	LC	LC	Reproduction	20 - 50 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A025	Bubulcus ibis	Héron garde-boeufs, Pique bœufs	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	50 - 100 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A026	Egretta garzetta	Aigrette garzette	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A026	Egretta garzetta	Aigrette garzette	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	10 - 800 Couples	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A027	Egretta alba	Grande Aigrette	o	/	/	/	Reproduction	1 - 14 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A027	Egretta alba	Grande Aigrette	o	/	/	/	Concentration	/	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A027	Egretta alba	Grande Aigrette	o	/	/	/	Hivernage	100 - 200 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A028	Ardea cinerea	Héron cendré	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	50 - 100 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A028	Ardea cinerea	Héron cendré	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	15 - 60 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A029	Ardea purpurea	Héron pourpré	o	LC	LC	LC	Reproduction	1 - 150 Couples	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A030	Ciconia nigra	Cigogne noire	o	EN, NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A031	Ciconia ciconia	Cigogne blanche	o	LC, NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A032	Plegadis falcinellus	Ibis falcinelle	o	NT	LC	LC	Hivernage	1 - 10 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A032	Plegadis falcinellus	Ibis falcinelle	o	NT	LC	LC	Reproduction	0 - 66 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A034	Platalea leucorodia	Spatule blanche	o	NA, NT, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A035	Phoenicopterus ruber	Flamant des Caraïbes	o	/	/	LC	Hivernage	2 000 -10 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A035	Phoenicopterus ruber	Flamant des Caraïbes	o	/	/	LC	Reproduction	1 000 -20 000 Couples	Présente	100%>p>15%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A036	Cygnus olor	Cygne tuberculé	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	5 - 10 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A036	Cygnus olor	Cygne tuberculé	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	25 -1 000 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A037	Cygnus columbianus bewickii	Cygne de Bewick	o	/	/	/	Hivernage	0 - 20 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A048	Tadorna tadorna	Tadorne de Belon	o	LC	LC	LC	Reproduction	/	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A048	Tadorna tadorna	Tadorne de Belon	o	LC	LC	LC	Hivernage	1 070 -2 040 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A050	Anas penelope	Canard siffleur	o	LC, NA	/	/	Hivernage	3 200 -6 500 Individus	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A051	Anas strepera	Canard chipeau	o	LC, NA	/	/	Hivernage	1 400 -6 200 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A052	Anas crecca	Sarcelle d'hiver	o	LC, NA, VU	/	LC	Hivernage	2 400 -7 450 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A054	Anas acuta	Canard pilet	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	500 -1 700 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A056	Anas clypeata	Canard souchet	o	LC, NA	/	/	Hivernage	2 900 -4 600 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A058	Netta rufina	Nette rousse	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	300 - 900 Individus	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A059	Aythya ferina	Fuligule milouin	o	LC, NA, VU	VU	VU	Hivernage	200 -1 300 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A061	Aythya fuligula	Fuligule morillon	o	LC, NT	LC	LC	Hivernage	0 - 10 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A072	Pernis apivorus	Bondrée apivore		LC	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A072	Pernis apivorus	Bondrée apivore		LC	LC	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A073	Milvus migrans	Milan noir		LC, NA	LC	LC	Reproduction	10 - 15 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A074	Milvus milvus	Milan royal		NA, VU	NT	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population

Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A074	Milvus milvus	Milan royal		NA, VU	NT	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A075	Haliaeetus albicilla	Pygargue à queue blanche		CR, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A080	Circus gallicus	Circaète Jean-le-Blanc		LC, NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A081	Circus aeruginosus	Busard des roseaux		NA, NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A081	Circus aeruginosus	Busard des roseaux		NA, NT	LC	LC	Reproduction	15 - 25 Couples	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A081	Circus aeruginosus	Busard des roseaux		NA, NT	LC	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A082	Circus cyaneus	Busard Saint-Martin		LC, NA	NT	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A082	Circus cyaneus	Busard Saint-Martin		LC, NA	NT	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Médiocre
Oiseaux	A084	Circus pygargus	Busard cendré		NA, NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A084	Circus pygargus	Busard cendré		NA, NT	LC	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A092	Hieraaetus pennatus	Aigle botté		NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A092	Hieraaetus pennatus	Aigle botté		NT	LC	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A093	Hieraaetus fasciatus	Aigle de Bonelli		EN	/	/	Sédentaire	0 - 15 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Médiocre
Oiseaux	A094	Pandion haliaetus	Balbuzard pêcheur	⊖	LC, NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A095	Falco naumanni	Faucon crécerellette		NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A098	Falco columbarius	Faucon émerillon		DD, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A098	Falco columbarius	Faucon émerillon		DD, NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A100	Falco eleonora	Faucon d'Éléonore		NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A103	Falco peregrinus	Faucon pèlerin		LC, NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A103	Falco peregrinus	Faucon pèlerin		LC, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A118	Rallus aquaticus	Râle d'eau	⊖	NA, NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A118	Rallus aquaticus	Râle d'eau	⊖	NA, NT	LC	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A119	Porzana porzana	Marouette ponctuée	⊖	NA, VU	LC	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A119	Porzana porzana	Marouette ponctuée	⊖	NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A125	Fulica atra	Foulque macroule	⊖	LC, NA	NT	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A125	Fulica atra	Foulque macroule	⊖	LC, NA	NT	LC	Hivernage	1 800 -10 700 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A127	Grus grus	Grue cendrée	⊖	CR, NA, NT	LC	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A127	Grus grus	Grue cendrée	⊖	CR, NA, NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A128	Tetrax tetrax	Outarde canepetière		EN, NA	VU	NT	Hivernage	100 - 200 Individus	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A128	Tetrax tetrax	Outarde canepetière		EN, NA	VU	NT	Reproduction	1 - 5 Couples	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre

Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A130	Haematopus ostralegus	Huitrier pie	O	LC	/	NT	Reproduction	62 - 65 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A131	Himantopus himantopus	Echasse blanche	O	LC	LC	LC	Reproduction	20 - 50 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A132	Recurvirostra avosetta	Avocette élégante	O	LC, NA	LC	LC	Reproduction	300 -1 000 Couples	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A132	Recurvirostra avosetta	Avocette élégante	O	LC, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A133	Burhinus oedicnemus	Oedicnème criard		LC, NA	LC	LC	Reproduction	5 - 10 Couples	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A133	Burhinus oedicnemus	Oedicnème criard		LC, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A138	Charadrius alexandrinus	Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent	O	NA, VU	LC	LC	Reproduction	23 - 72 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A140	Pluvialis apricaria	Pluvier doré		LC	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A140	Pluvialis apricaria	Pluvier doré		LC	LC	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A141	Pluvialis squatarola	Pluvier argenté	O	LC, NA	LC	LC	Hivernage	80 - 450 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A145	Calidris minuta	Bécasseau minute	O	LC, NA	LC	LC	Hivernage	10 - 400 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A147	Calidris ferruginea	Bécasseau cocorli	O	LC	VU	NT	Hivernage	40 - 100 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A149	Calidris alpina	Bécasseau variable	O	LC, NA	LC	LC	Hivernage	1 000 -3 700 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A151	Philomachus pugnax	/	O	NA, NT	/	/	Concentration	/	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A151	Philomachus pugnax	/	O	NA, NT	/	/	Hivernage	25 - 150 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A157	Limosa lapponica	Barge rousse	O	LC, NA	LC	NT	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A157	Limosa lapponica	Barge rousse	O	LC, NA	LC	NT	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A160	Numenius arquata	Courlis cendré	O	LC, NA, VU	VU	NT	Hivernage	50 - 150 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A162	Tringa totanus	Chevalier gambette	O	LC, NA	LC	LC	Hivernage	10 - 300 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A162	Tringa totanus	Chevalier gambette	O	LC, NA	LC	LC	Reproduction	10 - 30 Couples	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A166	Tringa glareola	Chevalier sylvain	O	LC	LC	LC	Hivernage	5 - 20 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A170	Phalaropus lobatus	Phalarope à bec étroit	O	NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	O	NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	O	NA	LC	LC	Concentration	50 - 120 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	O	NA	LC	LC	Reproduction	0 - 600 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A179	Larus ridibundus	Mouette rieuse	O	/	LC	LC	Reproduction	170 -1 800 Couples	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A179	Larus ridibundus	Mouette rieuse	O	/	LC	LC	Hivernage	500 - 600 Individus	Présente	15%>p>2%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A180	Larus genei	Goéland raillleur	O	/	LC	LC	Reproduction	100 - 250 Couples	Présente	100%>p>15%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A189	Gelochelidon nilotica	Sterne hansel	O	NA, VU	LC	LC	Reproduction	150 - 400 Couples	Présente	100%>p>15%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre
Oiseaux	A190	Sterna caspia	Sterne caspienne	O	NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Marginale	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A191	Sterna sandvicensis	Sterne caugek	O	LC, NA	/	/	Reproduction	1 - 800 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A193	Sterna hirundo	Sterne pierregarin	O	LC, NA	LC	LC	Reproduction	600 - 800 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A193	Sterna hirundo	Sterne pierregarin	O	LC, NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A195	Sterna albifrons	Sterne naine	O	/	/	/	Reproduction	150 - 400 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A196	Chlidonias hybridus	Guifette moustac	O	/	/	/	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A197	Chlidonias niger	Guifette noire	O	DD, EN	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A215	Bubo bubo	Grand-duc d'Europe	O	LC	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A222	Asio flammeus	Hibou des marais		NA, VU	LC	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Marginale	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A222	Asio flammeus	Hibou des marais		NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Marginale	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A224	Caprimulgus europaeus	Engoulevent d'Europe	O	LC, NA	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population

Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A229	Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe		NA, VU	VU	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A229	Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe		NA, VU	VU	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A229	Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe		NA, VU	VU	LC	Reproduction	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A231	Coracias garrulus	Rollier d'Europe		NA, NT	LC	LC	Reproduction	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A243	Calandrella brachydactyla	Alouette calandrelle	⚠	EN	LC	LC	Reproduction	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A246	Lullula arborea	Alouette lulu	⚠	LC, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A255	Anthus campestris	Pipit rousseline	⚠	LC, NA	LC	LC	Reproduction	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A272	Luscinia svecica	Gorgebleue à miroir		LC, NA	/	/	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A272	Luscinia svecica	Gorgebleue à miroir		LC, NA	/	/	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A293	Acrocephalus melanopogon	Lusciniole à moustaches	⚠	EN	LC	LC	Hivernage	20 - 50 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A293	Acrocephalus melanopogon	Lusciniole à moustaches	⚠	EN	LC	LC	Concentration	/	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A302	Sylvia undata	Fauvette pitchou	⚠	EN	NT	NT	Hivernage	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A338	Lanius collurio	Pie-grièche écorcheur	⚠	NA, NT	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A338	Lanius collurio	Pie-grièche écorcheur	⚠	NA, NT	LC	LC	Reproduction	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A379	Emberiza hortulana	Bruant ortolan	⚠	EN	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A384	Puffinus puffinus mauretanicus	Puffin des Baléares	⚠	NA, VU	CR	CR	Hivernage	1 - 5 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Médiocre
Oiseaux	A384	Puffinus puffinus mauretanicus	Puffin des Baléares	⚠	NA, VU	CR	CR	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A604	Larus michahellis	Goéland leucophée	⚠	LC, NA	LC	LC	Hivernage	/	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A604	Larus michahellis	Goéland leucophée	⚠	LC, NA	LC	LC	Reproduction	300 -1 000 Couples	Présente	2%>p>0%	Excellente	Non-isolée	Excellente	Médiocre

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Autres activités agricoles	Impacts et activités sur le site	Positive	Elevée	/	/	/
Espèces exotiques envahissantes	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Raz de marée, tsunamis	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Véhicules motorisés	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/

FR9112017 - Étang de Mauguio

Base de données mise à jour le : 08/02/2023
Fiche éditée le : 16/04/2025

Identification du site					
Code	FR9112017	Nom	Étang de Mauguio	Surface totale du site (ha)	7 024 ha
Directive	Oiseaux	Type	ZPS	Pourcentage de superficie marine (%)	0 %
Situation					
Localisation				Région(s) biogéographique(s)	
Région(s)	Occitanie	Département(s)	Gard (30), Hérault (34)	Méditerranéenne (100%)	
Gestion et propriété					
Gestionnaire(s)	Syndicat Mixte du Bassin de l'Or		Régimes de propriété	Domaine public maritime (41%), Propriété privée (personne physique) (28%), Domaine public de l'état (18%), Collectivité territoriale (13%)	
Description					
Caractère général du site					
	Classes d'habitats		Couverture		
	Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)		46 %		
	Marais salants, Prés salés, Steppes salées		20 %		
	Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées		20 %		
	Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)		5 %		
	Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)		5 %		
	Forêts caducifoliées		2 %		
	Dunes, Plages de sables, Machair		2 %		
Autres caractéristiques du site					
L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est une lagune en communication avec la mer par le grau qui relie le Sud-ouest de l'étang au port de Carnon.					
Qualité et importance					

L'étang de Mauguio est entouré par une gamme variée d'habitats naturels :

- un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon état de conservation, mais séparées du système lagunaire par une route littorale ;
- des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives Sud et Est et des lagunes temporaires riches en herbiers de Ruppia et des sansouïres sur la bordure des rives Nord ;
- des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur les rives Nord, où se développent des prés salés et des formations boisées (frênes, peupliers blancs) et d'anciens prés de fauche.

Les rives Nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral languedocien et sont marquées par une occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures).

La diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité confère à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste lagune et ses espaces périphériques sont un site majeur pour l'alimentation et la reproduction de nombreux échassiers et laro-limicoles.

La Cigogne blanche s'est récemment ré-installée en périphérie de l'étang, tandis que la vaste roselière abrite le Butor étoilé.

On signalera encore à l'extrémité orientale du site une population d'Outardes canepetières dans le secteur de la basse vallée du Vidourle, qui se poursuit dans le site voisin de la Petite Camargue laguno-marine.

Vulnérabilité

Entre les zones urbaines de Montpellier et Lunel, en expansion rapide, les voies de communication entre l'Europe du Nord et l'Espagne (autoroute, voies ferrées), les stations touristiques du littoral (Carnon, la Grande Motte); les causes de dégradation du complexe formé par l'étang et ses espaces périphériques sont nombreuses.

Les démarches de planification (schémas de cohérence territoriale) et l'existence d'une structure partenariale de gestion de ce territoire ont pour objectif de maîtriser les principaux problèmes.

Mesures de conservation

/

Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9112017 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9112017 (par la zone protégée)
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	84 %	Interntaionale	Petite Camargue	Partiel	84 %
Site classé selon la loi de 1930	70 %	Nationale et régionale	ETANG DE MAUGUIO	Inclus	69 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	14 %	Nationale et régionale	LE GRAND TRAVERS	Inclus	4 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	14 %	Nationale et régionale	LE PETIT TRAVERS	Inclus	2 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	14 %	Nationale et régionale	COTE DE PLAGNOL	Partiel	1 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	14 %	Nationale et régionale	LE PETIT COGUL	Inclus	1 %
Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	14 %	Nationale et régionale	TARTUGUIERES	Inclus	5 %
Site inscrit selon la loi de 1930	1 %	Nationale et régionale	STATION DE LA GRANDE MOTTE (site inscrit)	Partiel	1 %
Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique	1 %	Nationale et régionale	Marais de la Castillone	Inclus	1 %

Commentaires

/

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE															
	Légende														
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional								
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable								
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable						
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A021	Botaurus stellaris	Butor étoilé	o	NA, VU	LC	LC	Sédentaire	1 - 2 Couples	Rare	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A022	Ixobrychus minutus	/	o	EN, NA	LC	LC	Reproduction	2 - 4 Couples	Très rare	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A023	Nycticorax nycticorax	/	o	NA, NT	LC	LC	Concentration	10 - 40 Individus	Commune	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne
Oiseaux	A023	Nycticorax nycticorax	/	o	NA, NT	LC	LC	Hivernage	5 - 15 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Médiocre
Oiseaux	A024	Ardeola ralloides	/	o	LC	LC	LC	Reproduction	0 - 1 Couples	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A024	Ardeola ralloides	/	o	LC	LC	LC	Concentration	5 - 10 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne
Oiseaux	A026	Egretta garzetta	Aigrette garzette	o	LC, NA	LC	LC	Sédentaire	200 - 500 Individus	Commune	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A027	Egretta alba	Grande Aigrette	o	/	/	/	Sédentaire	100 - 250 Individus	Commune	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A029	Ardea purpurea	Héron pourpré	o	LC	LC	LC	Reproduction	5 - 10 Couples	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A029	Ardea purpurea	Héron pourpré	o	LC	LC	LC	Concentration	20 - 30 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A030	Ciconia nigra	Cigogne noire	o	EN, NA, VU	LC	LC	Concentration	5 - 10 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A031	Ciconia ciconia	Cigogne blanche	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	2 - 3 Couples	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A031	Ciconia ciconia	Cigogne blanche	o	LC, NA	LC	LC	Concentration	50 - 100 Individus	Commune	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A032	Plegadis falcinellus	Ibis falcinelle	o	NT	LC	LC	Concentration	50 - 290 Individus	Commune	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A032	Plegadis falcinellus	Ibis falcinelle	o	NT	LC	LC	Reproduction	0 - 15 Couples	Commune	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A034	Platalea leucorodia	Spatule blanche	o	NA, NT, VU	LC	LC	Concentration	20 - 120 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Médiocre
Oiseaux	A035	Phoenicopterus ruber	Flamant des Caraïbes	o	/	/	LC	Sédentaire	1 000 - 3 500 Individus	Commune	100%>p>15%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A073	Milvus migrans	Milan noir		LC, NA	LC	LC	Reproduction	5 - 10 Couples	Commune	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A073	Milvus migrans	Milan noir		LC, NA	LC	LC	Concentration	20 - 50 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A081	Circus aeruginosus	Busard des roseaux		NA, NT	LC	LC	Sédentaire	8 - 10 Couples	Commune	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne
Oiseaux	A082	Circus cyaneus	Busard Saint-Martin		LC, NA	NT	LC	Hivernage	5 - 10 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A094	Pandion haliaetus	Balbuzard pêcheur	o	LC, NA, VU	LC	LC	Concentration	1 - 5 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A098	Falco columbarius	Faucon émerillon		DD, NA	LC	LC	Hivernage	1 - 3 Individus	Très rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A119	Porzana porzana	Marouette ponctuée	o	NA, VU	LC	LC	Concentration	/	Présente	Non significative	/	/	/	Estimation impossible de la population
Oiseaux	A124	Porphyrio porphyrio	/	o	VU	LC	LC	Sédentaire	20 - 30 Couples	Commune	15%>p>2%	Bonne	Marginale	Bonne	Médiocre
Oiseaux	A128	Tetrax tetrax	Outarde canepetière		EN, NA	VU	NT	Hivernage	40 - 140 Individus	Commune	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A128	Tetrax tetrax	Outarde canepetière		EN, NA	VU	NT	Reproduction	2 - 5 Mâles	Très rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A128	Tetrax tetrax	Outarde canepetière		EN, NA	VU	NT	Concentration	60 - 200 Individus	Commune	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A131	Himantopus himantopus	Echasse blanche	o	LC	LC	LC	Hivernage	0 - 40 Individus	Très rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A131	Himantopus himantopus	Echasse blanche	o	LC	LC	LC	Concentration	100 - 300 Individus	Commune	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Moyenne
Oiseaux	A131	Himantopus himantopus	Echasse blanche	o	LC	LC	LC	Reproduction	160 - 220 Couples	Commune	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A132	Recurvirostra avosetta	Avocette élégante	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	50 - 250 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A132	Recurvirostra avosetta	Avocette élégante	o	LC, NA	LC	LC	Hivernage	200 - 1 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A133	Burhinus oedicnemus	Oedicnème criard		LC, NA	LC	LC	Reproduction	10 - 15 Mâles	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A135	Glareola pratincola	Glaréole à collier	o	EN	LC	LC	Concentration	12 - 50 Individus	Rare	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A135	Glareola pratincola	Glaréole à collier	o	EN	LC	LC	Reproduction	1 - 20 Couples	Rare	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Moyenne	Bonne
Oiseaux	A138	Charadrius alexandrinus	Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent	o	NA, VU	LC	LC	Reproduction	3 - 10 Couples	Rare	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A138	Charadrius alexandrinus	Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent	o	NA, VU	LC	LC	Concentration	10 - 25 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A140	Pluvialis apricaria	Pluvier doré		LC	LC	LC	Hivernage	110 - 530 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A151	Philomachus pugnax	/	o	NA, NT	/	/	Concentration	50 - 100 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A157	Limosa lapponica	Barge rousse	o	LC, NA	LC	NT	Concentration	20 - 40 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A166	Tringa glareola	Chevalier sylvain	o	LC	LC	LC	Hivernage	0 - 50 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A166	Tringa glareola	Chevalier sylvain	o	LC	LC	LC	Concentration	100 - 200 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	o	NA	LC	LC	Concentration	80 - 3 300 Individus	Présente	100%>p>15%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	o	NA	LC	LC	Reproduction	1 470 - 4 390 Couples	Présente	100%>p>15%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A180	Larus genei	Goéland raillieur	o	/	LC	LC	Reproduction	0 - 470 Couples	Présente	100%>p>15%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A180	Larus genei	Goéland raillieur	o	/	LC	LC	Concentration	20 - 80 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A189	Gelochelidon nilotica	Sterne hansel	o	NA, VU	LC	LC	Reproduction	740 - 900 Couples	Présente	100%>p>15%	Bonne	Marginale	Bonne	Bonne
Oiseaux	A190	Sterna caspia	Sterne caspienne	o	NT	LC	LC	Concentration	5 - 15 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A191	Sterna sandvicensis	Sterne caugek	o	LC, NA	/	/	Reproduction	0 - 250 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A191	Sterna sandvicensis	Sterne caugek	o	LC, NA	/	/	Concentration	50 - 150 Individus	Présente	Non significative	/	/	/	Bonne
Oiseaux	A191	Sterna sandvicensis	Sterne caugek	o	LC, NA	/	/	Hivernage	10 - 110 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A193	Sterna hirundo	Sterne pierregarin	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	150 - 380 Couples	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A195	Sterna albifrons	Sterne naine	o	/	/	/	Reproduction	60 - 130 Couples	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Bonne	Bonne
Oiseaux	A196	Chlidonias hybridus	Guifette moustac	o	/	/	/	Hivernage	40 - 130 Individus	Rare	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne
Oiseaux	A196	Chlidonias hybridus	Guifette moustac	o	/	/	/	Concentration	100 - 200 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A197	Chlidonias niger	Guifette noire	o	DD, EN	LC	LC	Concentration	20 - 50 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A229	Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe		NA, VU	VU	LC	Hivernage	10 - 20 Individus	Commune	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A229	Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe		NA, VU	VU	LC	Reproduction	5 - 10 Couples	Présente	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A231	Coracias garrulus	Rollier d'Europe		NA, NT	LC	LC	Reproduction	10 - 20 Couples	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A255	Anthus campestris	Pipit rousseline	o	LC, NA	LC	LC	Concentration	10 - 15 Individus	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne
Oiseaux	A255	Anthus campestris	Pipit rousseline	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	1 - 5 Couples	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne

Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale	
Oiseaux	A293	Acrocephalus melanopogon	Lusciniole à moustaches	O	EN	LC	LC	Reproduction	10 - 20 Couples	Rare	Non significative	/	/	/	Moyenne

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Accumulation de matière organique	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Antagonisme avec des espèces introduites	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Aquaculture (eau douce et marine)	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Autres formes de transport et de communication	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Chasse	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Envasement	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Erosion	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Espèces exotiques envahissantes	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Eutrophisation (naturelle)	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle	Impacts et activités sur le site	Négative	Faible	/	/	/
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Pâturage	Impacts et activités sur le site	Positive	Moyenne	/	/	/
Piétinement, surfréquentation	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Routes, autoroutes	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/
Urbanisation continue	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Véhicules motorisés	Impacts et activités sur le site	Négative	Moyenne	/	/	/

FR9112035 - Côte languedocienne

Base de données mise à jour le : 08/02/2023
Fiche éditée le : 16/04/2025

Identification du site					
Code	FR9112035	Nom	Côte languedocienne	Surface totale du site (ha)	72 457 ha
Directive	Oiseaux	Type	ZPS	Pourcentage de superficie marine (%)	100 %
Situation					
Localisation				Région(s) biogéographique(s)	
Région(s)	Occitanie	Département(s)	Aude (11), Gard (30), Hérault (34)	Méditerranéenne (100%)	
Gestion et propriété					
Gestionnaire(s)	Office français de la Biodiversité - Délégation de façade maritime Méditerranée		Régimes de propriété	Domaine public maritime (100%)	
Description					
Caractère général du site					
	Classes d'habitats		Couverture		
	Mer, Bras de Mer		100 %		
Autres caractéristiques du site					
Le site s’étend de l’estran jusqu’au 3 milles au large et est divisé en deux zones, laissant une partie non couverte le long du littoral, de 23 km entre la ville d’Agde et celle de Vendres. Vu depuis la mer, le site Natura 2000 « Côte languedocienne » est composé de trois entités paysagères interagissant les unes avec les autres : • La bande côtière essentiellement composée de vastes étendues sableuses et son cordon dunaire plus ou moins urbanisé et artificialisé ; • Les complexes lagunaires ainsi que les différents canaux et la plaine littorale avec son tissu urbain ; • L’arrière-pays et ses reliefs plus accidentés et montagneux.					
Qualité et importance					
Vulnérabilité					
Vulnérabilité : * Forte fréquentation touristique et de loisirs : le nautisme motorisé génère un dérangement très impactant. * La pêche professionnelle a un impact positif de nourrissage des oiseaux par les déchets de pêche . Cet impact est toutefois compensé par l'impact très négatif de nourrissage des Goélands leucophées qui concurrencent fortement les laridés patrimoniaux sur ce secteur. * Installation de ferme éolienne au stade expérimental (2023) * Zones propices pour des fermes éoliennes commerciales : évaluation des impacts * Incidences des captures accidentelles par la pêche professionnelle et de loisir qui restent à évaluer.					
Mesures de conservation					
Les forces armées sont susceptibles de conduire des activités sur ce site. Il s'agit notamment de navigation d'unité de surface ou sous-marine, survol d'aéronef, parachutage, tir, mouillage, émission acoustique ou électromagnétique (radar, sonar, radio),					
Type de protection					
Type	Recouvrement du site FR9112035 (par ce type de protection)	Echelle	Nom	Type de chevauchement	Recouvrement du site FR9112035 (par la zone protégée)

Aucune protection		Nationale et régionale	Non précisé	Non précisé	
Commentaires					
La limite supérieure du site correspond à la laisse de haute mer. Donc site 100% marin conformément à la définition des espaces marins donnée par le décret du 15 mai 2008 Art 414-2-1, mais intégrant la frange terrestre de la zone de marnage (= estran ou z					

Espèces mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE																
	Légende															
	Espèces disparues	EX	Eteinte au niveau mondial	EW	Eteinte à l'état sauvage	RE	Disparue au niveau régional									
	Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique	EN	En danger	VU	Vulnérable									
	Autres catégories	NT	Quasi menacée	LC	Préoccupation mineure	DD	Données insuffisantes	NA	Non applicable							
Information sur l'espèce								Information sur la population			Evaluation de la population				Qualité des données	
Groupe taxonomique	Code Natura 2000	Nom latin	Nom vernaculaire	Espèce inféodée aux milieux aquatiques	Liste rouge de France métropolitaine	Liste rouge européenne de l'UICN	Liste rouge mondiale de l'UICN	Statut	Nombre	Abondance	Population relative	Degré de conservation	Isolement	Evaluation globale		
Oiseaux	A001	Gavia stellata	Plongeon catmarin	o	DD, NA	LC	LC	Hivernage	0 - 1 Individus	Rare	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Estimation impossible de la population	
Oiseaux	A002	Gavia arctica	Plongeon arctique	o	DD, NA	LC	LC	Hivernage	50 - 50 Individus	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne	
Oiseaux	A003	Gavia immer	Plongeon imbrin	o	VU	VU	LC	Hivernage	0 - 1 Individus	Rare	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Estimation impossible de la population	
Oiseaux	A014	Hydrobates pelagicus	Pétrel tempête, Océanite tempête	o	NA, VU	LC	LC	Concentration	5 - 10 Individus	Présente	100%>p>15%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne	
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	o	NA	LC	LC	Reproduction	250 - 800 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne	
Oiseaux	A176	Larus melanocephalus	Mouette mélanocéphale	o	NA	LC	LC	Hivernage	500 -1 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne	
Oiseaux	A177	Larus minutus	Mouette pygmée	o	/	/	/	Reproduction	100 - 500 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne	
Oiseaux	A177	Larus minutus	Mouette pygmée	o	/	/	/	Hivernage	10 - 100 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne	
Oiseaux	A180	Larus genei	Goéland railleur	o	/	LC	LC	Reproduction	400 -1 800 Couples	Présente	100%>p>15%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Moyenne	
Oiseaux	A181	Larus audouinii	Goéland d'Audouin	o	NA	LC	VU	Reproduction	1 - 10 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Marginale	Moyenne	Bonne	
Oiseaux	A189	Gelochelidon nilotica	Sterne hansel	o	NA, VU	LC	LC	Concentration	100 - 100 Individus	Présente	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne	
Oiseaux	A191	Sterna sandvicensis	Sterne caugek	o	LC, NA	/	/	Reproduction	2 000 -5 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne	
Oiseaux	A191	Sterna sandvicensis	Sterne caugek	o	LC, NA	/	/	Hivernage	100 - 500 Individus	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Bonne	
Oiseaux	A193	Sterna hirundo	Sterne pierregarin	o	LC, NA	LC	LC	Reproduction	500 -1 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne	
Oiseaux	A193	Sterna hirundo	Sterne pierregarin	o	LC, NA	LC	LC	Concentration	500 -1 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne	
Oiseaux	A195	Sterna albifrons	Sterne naine	o	/	/	/	Reproduction	500 - 850 Couples	Présente	100%>p>15%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Moyenne	
Oiseaux	A384	Puffinus puffinus mauretanicus	Puffin des Baléares	o	NA, VU	CR	CR	Concentration	10 - 30 Individus	Présente	2%>p>0%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Moyenne	
Oiseaux	A392	Phalacrocorax aristotelis desmarestii	/	o	/	/	/	Concentration	5 - 10 Individus	Rare	2%>p>0%	Moyenne	Non-isolée	Moyenne	Estimation impossible de la population	
Oiseaux	A464	Puffinus yelkouan	Puffin yelkouan	o	DD, EN, NA	LC	VU	Concentration	1 000 -2 000 Individus	Présente	15%>p>2%	Bonne	Non-isolée	Bonne	Bonne	

Activités, menaces et pressions						
	Légende					
	Caractéristiques de l'incidence	Incidence élevée	Incidence moyenne	Incidence faible		
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence positive				Menaces, pressions et activités non évaluée	
	Menaces, pressions et activités ayant une incidence négative					
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur un site	Localisation	Influence	Intensité	Pollution	Habitats impactés	Espèces impactées
Autres intrusions et perturbations humaines	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/
Sports nautiques	Impacts et activités sur le site	Négative	Elevée	/	/	/